

Médicaments

Facteurs liés à l'âge	Facteurs de risque [complétez les phrases]	Prise en charge [complétez les phrases]
<ul style="list-style-type: none"> • Diminution de l'élimination rénale (rein) des médicaments • Diminution du débit sanguin hépatique (foie) et de l'élimination des médicaments • En principe, les personnes âgées ont plus de difficulté à éliminer les médicaments de leur système. • Perte de poids • Une augmentation des pathologies médicales peut conduire à la prise de médicaments multiples, les interactions entre médicaments et des problèmes de suivi et de l'évaluation des médicaments. Plus on prend de médicaments (et lorsque la dose augmente), plus il y a le potentiel pour des effets secondaires graves. Les personnes ayant une déficience intellectuelle se plaignent rarement des effets secondaires. Elles ne seront pas informées de manière convenable concernant les effets secondaires potentiels des médicaments. • Souvent les intervenants ne savent pas comment procéder à la surveillance des effets secondaires. • Les personnes âgées deviennent plus sensibles aux effets neurologiques des médicaments. • Indexe thérapeutique étroit - la différence entre une dose utile et nuisible est faible. • La consommation prolongée des médicaments psychotropes pour les personnes atteintes d'une DI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui prennent des médicaments _____ ce qu'ils prennent ou _____ • Le personnel qui administre les médicaments fait état d'un manque de connaissances concernant _____, les effets secondaires et les pratiques de _____. • Le calcul des doses thérapeutiques est souvent basé sur des essais de jeunes adultes en bonne santé 	<ul style="list-style-type: none"> • Veiller à ce que tous les médicaments soient _____ • Être au courant concernant les médicaments administrés et le potentiel _____ • Promouvoir _____ • Décourager _____ • Un réexamen des médicaments est recommandé chaque année pour _____ et tous les six mois pour les personnes qui prennent plus de _____ • L'arrêt ou la réduction des médicaments qui sont _____ • Une surveillance attentive des médicaments _____ et médicaments _____