



## Feuille d'information

### La démence et le Syndrome de Down

- Il est largement admis que les personnes atteintes du Syndrome de Down sont plus susceptibles que la population générale de développer la maladie d'Alzheimer en vieillissant.
- Cependant, le diagnostic peut être problématique pour plusieurs raisons. Celles-ci comprennent:
  - la grande variabilité intra-individuelle quant au fonctionnement cognitif
  - les différentes techniques diagnostiques et méthodologiques utilisées dans le domaine
  - la difficulté d'obtenir des références concernant le fonctionnement cognitif qui aideront à évaluer les changements cognitifs et comportementaux.
- Dans le « diagnostic éclipsant » (Reiss et al., 1982) on attribue des changements dans le comportement à la déficience intellectuelle. Pour les personnes atteintes du Syndrome de Down, le diagnostic éclipsant peut signifier qu'ils sont orientés vers un spécialiste tardivement ou même pas du tout.
- De manière générale, il n'y a pas d'examen précis pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
- Elle est diagnostiquée par un processus d'élimination. Les antécédents médicaux sont étudiés et un examen médical est effectué.
- Le stade précoce d'Alzheimer passe souvent inaperçu avec le Syndrome de Down parce que les comportements anciens ont tendance à réapparaître. Le personnel a tendance à mettre l'accent sur les comportements plutôt que sur la cause de ces comportements. Il peut être difficile à obtenir des informations fiables concernant les antécédents médicaux lorsque la personne a un niveau de fonctionnement cognitif réduit.
- Les problèmes médicaux peuvent se manifester au niveau du comportement. Les examens couramment employés pour le diagnostic d'Alzheimer ne tiennent pas compte des déficiences existantes de la personne.

[La feuille d'information n° VDI 18 comporte une feuille de questions n° VDIQ 18 correspondante]